n.° 42.

41

Memoire qui Renferme plusieurs observations particuliere, sur un vice qui se trouve quelques fois sous la Langue des Enfant nouveaux Nés, et qui les Empêchent de teter.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C

Premiere Observation.

je fus mandés en 1746. pour Couper le filet a un Enfant, quoy que je fis cette operation comme jl Convenoit, Neanmoins l'enfant ne put prendre le Mamelon; lon vint me chercher le lendemain, et lon me dit que je navois pas Coupé le filet a cet Enfant, puis quil ne pouvoit pas teter. jexaminé de nouveau la bouche de l'enfant, quoy que je fusse certain d'avoir fait la division suffisante; jassuré quil Etoit bien Coupé, et je ny Retouché pas davantage de crainte de Couper l'artere; la sage femme qui avoit Reçu cet Enfant venant Rendre visite ala Mere, fut justruitte du fait dont jl sagit, et décida sur le champs que le filet navoit pas Eté bien Coupé; et se mit en devoir de le Couper, ce quelle fit plus hardiment que Moy, ne connoissant pas le danger; Elle ~~coupa~~ donna un Coup de Ciseaux, et au lieu du filet quelle Croioit Couper, elle Coupa l'artere, et dans linstant, donna l'enfant ala nourrice pour le faire teter.

ARC 26 n° 41

on luy présenta le téton, et jl nen téta pas mieux.
dans ce moment, la nourrice saperçeut que lénfant
Rendoit beaucoup de sang par la bouche, et le Montra
ala sage femme; Elle Reconnut sa faute sur le champ
et demanda du secours; lon vint me chercher, et je
vis dabord dequoy jl sagissoit.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N

Ajant vü Couler le sang asses Abondamment par une
des Commissures des lévres, je voulus massurer sil
sortoit de la veine, ou de lártere; et pour cela je pinçay
le Nez a lénfant pour luy faire ouvrir la bouche; et
dans linstant, le sang sortit par jet et secousses Repetées,
comme cela arrive chaque fois quil se trouve une artere
ouverte dans quelques parties. jarretay lhemorragie par
le moyen dun stilet comme Mauriceau le propose page,
492. dans ses observations sur les accouchements; je le
fis chauffer suffisamment pour que láction du feu
put Crisper la partie divisée en la Cauterisant; et je
lappliquay sur la division de lártere, en soulevant la
langue avec un doigt, et pendant cette Operation, je fesois
pincer le nez de lénfant pour que la bouche fut toujours
ouvertte, et dans linstant, le sang fut arreté; cest je pence
le moyen le plus prompt que lon doit Employer en pareil
Cas; sy lon se fut apperceut de cet accident a lenfant dont
parle dionis dans son traité des accouchement page trois cent
soixante et seize, et que lon Eut Employé le moyen qui

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ma Reussy, on auroit Conservé la vie a cet Enfant, et
il nauroit pas succé tout son sang, comme il fit, suivant
le Rapport de l'auteur. Car la Compression na pas lieu;
non plus que les stiptiques que dionis; proposé ny la ligature
proposé par Guillemeau page six cent quatre vingt quatre,
en parlant des vices de la langue dans ses oeuvres de
chirurgie; que je ne Crois pas devoir Etre Emploiés, par
les suittes facheuses qui en peuvent Resulter, comme le
Remarque Riolant Medecin, qui dit avoir vû arriver des
Convulsions ala langue des Enfants a qui lon avoit pratiqué
Cette operation; de meme que la gangrene qui avoit fait
perir nombres denfants. Cest ainsy, et par le meme
Moyen, que Mr. domergue chirurgien Major de landau a
Guery un homme a qui lon avoit ouvert lartere Ranule
par la saignée. je ne Crois pas linstrument proposé par feu
mr. petit trop Convenable en pareil Cas; comme je vais le
demontrer par le detail suivant: cet instrument est une
fourchette a deux branches, sa Composition est en bois; cest
ce qui donne la facilité de le faire plus grand ou plus petit
suivant le diametre de la bouche de lenfant. les deux branches
ou fourchettans passent sous les deux parties laterales de la
langue, et lespace qui se trouve entre ses deux branches
Compriment lendroit ou se trouve la division du vaisseau,
aidé sans doutte dun petit tamponnage de charpy, chargé
de quelques Remedes astringent, capable de Crisper le vaisseau

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N
ARC 26 n° 41
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

la fourchette ne sert que pour Maintenir le Remede, —
lextremité de la queüe ou manche de la ditte fourchette
est assujetiz par le moyen de la machoire jnferieure
a lendroit de la simphise du Menton, et se trouve
comme-Enchassée entre cette derniere partie, et le dessous
de la langue. jl doit Resulter de lusage de cette fourchette,
deux point de compression qui doivent faire souffrir lenfant
tant quelle Reste dans la bouche; lenfant ne doit cesser
de Crier, et par cette agitation, le mouvement tumultueux
et jrregulier du sang, forcera toujours le vaisseau; d'ou
jl Resulte que la Reunion ne pourra se faire; dailleur —
lenfant Etant gené sans cesse, ne peut prendre de —
nourriture; au Contraire, par le moyen que Mauriceau
propose; et qui ma Reussy de meme qua d'autres avant
moy: lenfant ne souffre que linstant ~~quil faut~~ que lon —
applique le Cautere, et lon peut luy donner de la nourriture
quelque tems apres: je pence que ce moyen est plus doux
pour lenfant, et plus facile pour celuy qui lemploije.
Apres cette Operation, je fis tenir lenfant Couché sur le coté,
et jordonnay quon luy fit prendre du lait Coupé, avec vn
biberon jusquau lendemain Matin que jevois le voir.
Metant Rendus au tems jndiqué, je luy fit presenter le teton,
jl ne put jamais tirer de lait, quoy quil fit tous ses Efforts,
Alors soupçonnant quelque vice de Conformation, jexaminé
les parties latteralles de la langue, et jobservay au bord
jnferieur, vers son milieu du coté gauche, vne bride ou
petit pillier qui sattachoit ala base de la Machoire —

jnferieure, et qui tiroit la langue Obliquement.
jexaminay alors la langue, et je vis quelle ne pouvoit approcher du bord des alvéolles; je Coupay cette bride avec des Ciseaux; dans le moment la langue sallongea, et se porta de lautre Coté de la bouche: je pensay quil pouvoit y avoir quelquautre brides jen fis la Recherche, et jen trouvay deux que je Coupay Comme lautre; et apres cette Operation, lenfant poussa sa langue au dela des levres, et prit le têton, ce quil navoit pas encore pu faire, depuis quatre jours quil Etoit nay: je nay point apperçue de chutte des Levre; jl y avoit tres peu dinflammation: jl Resulte de tout cela que sy je neus pas fait lexamen de la bouche de cet Enfant, quil nauroit jamais têtés; et lon auroit Etés obligés de lelever par dautres moyens, comme jl est arrivés a quelques Enfants qui nont jamais têtés.

Seconde Observation

Cette premiere observation ma Rendu attentif dans dautres occasions, et ma servy deux fois depuis.

En 1747. je vis un Enfant qui navoit pas besoin quon luy Coupat le filet, mais jl avoit une Cohesion ou adherence, que setoit formée Entre la partie Lateralle droitte de la langue, et les parties au dessous, qui formoient un Espece de Conduit depuis la baze de la Langue, jusquauprès du filet. Ce qui men fit appercevoir, fut un petit trou, que je découvris auprès du filet, je passay un petit stillet Crenelé, ala faveur du quel

ACADEMIE [...] CHIRURGIE C N
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

je conduisit un bistoury: ~~La Langue Etoit totalement~~
et je debriday toutte la membrane qui formoit la ditte
Cohesion: La Langue Estoit totalement bridée de ce Coté
la, et ne pouvoit Executer ses mouvements ordinaires;
il sortit quelques gouttes de sang, et Lenfant teta sur le
champ, ce quil ne pouvoit faire auparavent.

Lon peut se servir en pareil Cas, de Ciseaux mousse,
par ce moyen Lon ne craind pas de blesser Lenfant,
Comme Cela pouvoit arriver avec le bistoury, sy Lenfant
Remuoit.

pour faire Cette operation, il faut faire pincer le nez de
Lenfant par un aide; afin quil tienne la bouche ouverte,
et Celuy qui oppere doit Relever la langue de Lenfant
Avec le doigt indicateur, et tenir le stillet avec le poulce, et
le doigt du milieu; par ce moyen, il a toutte la
facilité dopperer: il nest pas necessaire de faire une
incision profonde, il pouvoit en Resulter un grand mal,
Comme je lay vü arriver a un Enfant pour Lequel jay
Esté mandé apres que Lon Eut pratiqué cette opperation;
Lon fit Lincision profonde pour Empêcher La Reunion des
brides, Cest ce qui ne doit point inquieter; quand Elles sont
bien Coupées, Lon ne doit point Craindre La Reunion;
on doit seulement avoir Lattention de faire passer le doigt
de tems en tems, dans Lendroit, ou Etoient les brides, et
Cela suffit pour sopposer ala Reunion supposé quelle fut
possible.

troisieme Observation.

je fus mandé lannée derniere Rüe des blanc Manteaux pour Couper le filet a vn Enfant, a qui la sage-femme lavoit deja coupe; Cependant lenfant ne tetoit pas librement ny de suitte, il y alloit par secousses: jexaminay la bouche, et ji apperceut deux brides, vne de chaque Coté, lune avoit au moins quatre lignes de Longueur, et tiroit la Langue obliquement; lautre Etoit tres Courte, et bridoit fortement la Langue.

je Les Coupay toutte les deux, et lenfant a tres bien tetté depuis.

il Resulte de ces faits, vne Reflexion qui paroit toutte naturelle, je veut dire que ses brides Restant sous la Langue des Enfant Lempeche de faire ses mouvemens naturels, et Contribüe sans doutte ala difficulté de la prononciation, et au béguaiement. Comme je lay trouvé a vn Enfant de six ans qui avoit beaucoup de difficulté a prononcer, pour lequel je fus Consulté; ~~je~~ jEsaminés les parties latteralles de la Langue; ji trouvay deux brides, vne de chaque Coté, posés differamment lune de lautre, Celle du Coté droit Etoit tres Courte, et avoit plus dépaisseur que lautre; Elle Etoit scituée vers le milieu de la Langue; lautre Etoit plus longue et tres fine, a peine pouvoit on lappercevoir, Elle Etoit scituée vis avis la dent Cannine; je les Coupay touttes les deux, celle du

ACADÉMIE DE CHIRURGIE
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Coté droit fournit quelques gouttes de sang, et Lautre
n'en Rendit point; Lénfant prononcea fort bien:
j'appris par même sa mere, que cet Enfant avoit Eu mal
ala bouche vers Lâge de trois ans; et q'uil avoit Eté traite
dans cé tems la pour une humeur scorbutique: je crois que
lon peut attribüer la Cause de ses brides aux ulceres que
cet Enfant a Eu dans la bouche; puis que d'ailleur, il
avoit tèté suffisamment pour sélever; Lon massura quil
avoit toujours Eté tres délicat pendant qu'il fut en
nourrice; sans neanmoin que Lón ait pu me dire, sil
avoit Eu de la difficulter a têter.
Les praticiens qui ont observés les vices de la Langue
aux Enfants nouveaux Nez; et qui nont pas trouvé le
filet ordinaire Exceder Létat naturel; ou qui lon trouvé
dans le Cas ou il faloit le Couper pour donner a
Lénfant la facilité de têter; et que malgré cette
opperation, les Enfants nont pu têter; ont attribüé
alors ce vice ala langue; attendu quelle paroit plus
Courte quelle ne doit Etre, et plus grosse; Cela peut arriver
quelques fois; mais ajant la Connoissance des vices que je
viens de Rapporter; on ne sera pas surpris de trouver la
Langue dans cet Etat; Car plus la Langue est Retiré
sur Elle meme; plus Elle doit présenter de volume

et par consequent diminuer de Longueur; mais
des que l'on a coupé les brides dont jay parlé;
la Langue s'allonge, et diminue de volume, et les
Enfants peuvent têter sur le Champ, ce qu'ils ne
pouvoient faire auparavant. /.

Maurain premier

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE